



. . . . 26.06.2026

. . : 214786/10772

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 26-06-2026

ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66100 ΔΡΑΜΑ  
Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου  
Τηλ.: 25213-51247  
Ηλ. ταχ.: simoglouk@pamth.gov.gr  
Ιστότοπος: planthealthdrama.wordpress.com

## ΘΕΜΑ: Διαβρώτικα στον αραβόσιτο - Επισημάνσεις

ΣΧΕΤ.: α) Τα με αρ. 12089/20-06-2017, 10393/31-05-2018, 11146/23-05-2019, 183235/10070/21-06-2022, 181444/9346/14-06-2023, 193930/9267/10-06-2025 έγγραφά μας

β) [Το με αρ. 2963/19-02-2020 έγγραφό μας: «Διαβρώτικα - επισημάνσεις ορθής αντιμετώπισης»](#)

Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο έχει διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε ικανοποιητική αμειψισπορά αραβοσίτου κυρίως με χειμερινά σιτηρά, ηλιάνθος κλπ. Είναι το σημαντικότερο βιώσιμο μέτρο αντιμετώπισης τού Διαβρώτικα και εκτιμάται πως το έντομο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Το έντομο παρακολουθείται ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια από τη ΔΑΟΚ Δράμας και εκδίδονται ενημερώσεις και Δελτία Προειδοποιήσεων σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας. Η έξοδος των ενηλίκων τού εντόμου έχει ξεκινήσει.

Τα ανήλικα στάδια τού εντόμου (προνύμφες - σκουλήκια) αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα τού αραβοσίτου και όταν είναι σε μεγάλους αριθμούς προκαλούν πλάγιασμα των φυτών λόγω κακής στήριξης, τα οποία μετά επανέρχονται στην όρθια στάση προς το φως αποκτώντας μόνιμη κάμψη στο κεντρικό στέλεχος.

Οι καλλιέργειες αραβοσίτου στην ΠΕ Δράμας βρίσκονται **στην έναρξη της άνθησης**. Οι καλλιεργητές αραβοσίτου της Π.Ε. Δράμας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι καλλιέργειές τους να έχουν επάρκεια ύδατος κατά τη διάρκεια τού σταδίου της άνθησης που η έναρξή του σηματοδοτείται από την εμφάνιση των νηματοειδών στύλων τού σπάδικα, μέχρι την απόπτωση των στύλων, όπως φαίνεται στις παράπλευρες εικόνες αρχείου. Είναι το ουσιαστικότερο μέτρο εξασφάλισης καλής γονιμοποίησης και στη συνέχεια καρπόδεσης.

Λεπτομερείς οδηγίες διαχείρισης και αντιμετώπισης τού Διαβρώτικα έχουν εκδοθεί στο ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΑΟΚ Δράμας και είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο:


<https://planthealthdrama.wordpress.com/2020/02/19/διαβρώτικα-οδηγίες-αντιμετώπισης-2020/>



Εικόνα 1. Εμφάνιση στύλων (εικόνα αρχείου ΔΑΟΚ Δράμας).



Εικόνα 2. Απόπτωση στύλων (η εικόνα δείχνει το στάδιο τού ~70% γονιμοποίησης) (εικόνα αρχείου ΔΑΟΚ Δράμας).



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1	Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας
2	Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας
3	Καλλιεργητές Π.Ε. Δράμας (βάσει λίστας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης α) Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ β) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Π.Α.Μ.Θ., Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2	Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης Ηλεκτρονική αποστολή
3	Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας Αγ. Λουκάς - Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
4	ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Αν. Μακεδονίας geoteeam@otenet.gr - Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του.
5	Εσωτερική διανομή Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας